UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 01038101 0

Hermitte, Charles

Sur la fonction exponentielle

QA
342
H47

Presented to the
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO
by

PROFESSOR K.O. MAY

SUR
LA FONCTION EXPONENTIELLE,

PAR M. CH. HERMITE,

PROFESSEUR A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET A LA FACULTÉ DES SCIENCES,
MEMBRE DE L'INSTITUT, MEMBRE ÉTRANGER DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ET DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE LONDRES,
CORRESPONDANT DES ACADÉMIES DES SCIENCES DE BERLIN, SAINT-PÉTERSBOURG, DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE GOETTINGUE,
DE L'ACADÉMIE PONTIFICALE DES NUOVI LINCEI,
DE L'INSTITUT LOMBARDE DES SCIENCES ET LETTRES DE MILAN, DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES DE LIÈGE,
DOCTEUR EN PHILOSOPHIE DE LA FACULTÉ DE KOENIGSBERG.

PARIS,

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,
SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.

1874

QA
342
H47

SUR

LA FONCTION EXPONENTIELLE.

I. Étant donné un nombre quelconque de quantités numériques $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, on sait qu'on peut en approcher simultanément par des fractions de même dénominateur, de telle sorte qu'on ait

$$\alpha_1 = \frac{A_1}{A} + \frac{\delta_1}{A\sqrt[n]{A}},$$

$$\alpha_2 = \frac{A_2}{A} + \frac{\delta_2}{A\sqrt[n]{A}},$$

.....

$$\alpha_n = \frac{A_n}{A} + \frac{\delta_n}{A\sqrt[n]{A}},$$

$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ ne pouvant dépasser une limite qui dépend seulement de n . C'est, comme on voit, une extension du mode d'approximation résultant de la théorie des fractions continues, qui correspondrait au cas le plus simple de $n = 1$. Or on peut se proposer une généralisation semblable de la théorie des fractions continues algébriques, en cherchant les expressions approchées de n fonctions, $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ par des fractions rationnelles $\frac{\Phi_1(x)}{\Phi(x)}, \frac{\Phi_2(x)}{\Phi(x)}, \dots, \frac{\Phi_n(x)}{\Phi(x)}$, de manière que les développements en série suivant

H.

les puissances croissantes de la variable coïncident jusqu'à une puissance déterminée x^M . Voici d'abord à cet égard un premier résultat qui s'offre immédiatement. Supposons que les fonctions $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ soient toutes développables en séries de la forme $\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \dots$ et faisons

$$\Phi(x) = Ax^m + Bx^{m-1} + \dots + Kx + L.$$

On pourra en général disposer des coefficients $A, B, \dots, L$ de manière à annuler dans les n produits $\varphi_i(x)\Phi(x)$, les termes en

$$x^M, \quad x^{M-1}, \dots, \quad x^{M-\mu_i+1},$$

μ_i étant un nombre entier arbitraire. Nous poserons ainsi un nombre d'équations homogènes de premier degré égal précisément à μ_i , et l'on aura

$$\varphi_i(x)\Phi(x) = \Phi_i(x) + \varepsilon_1 x^{M+1} + \varepsilon_2 x^{M+2} + \dots,$$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ étant des constantes, $\Phi_i(x)$ un polynôme entier de degré $M - \mu_i$. Or cette relation donnant

$$\varphi_i(x) = \frac{\Phi_i(x)}{\Phi(x)} + \frac{\varepsilon_1 x^{M+1} + \varepsilon_2 x^{M+2} + \dots}{\Phi(x)},$$

on voit que les développements en série de la fraction rationnelle et de la fonction seront en effet les mêmes jusqu'aux termes en x^M , et, comme le nombre total des équations posées est $\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n$, il suffit d'assujettir à la seule condition

$$\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n = m,$$

les entiers μ_i restés jusqu'ici absolument arbitraires. C'est cette considération si simple qui a servi de point de départ à l'étude de la fonction exponentielle que je vais exposer, me proposant d'en faire l'application aux quantités $\varphi_1(x) = e^{ax}$, $\varphi_2(x) = e^{bx}$, ..., $\varphi_n(x) = e^{hx}$.

II. Soit pour abréger $M - m = \mu$; je compose, avec les constantes $a, b, \dots, h$, le polynôme

$$F(z) = z^\mu (z - a)^{\mu_1} (z - b)^{\mu_2} \dots (z - h)^{\mu_n},$$

de degré $\mu + \mu_1 + \dots + \mu_n = M$, et j'envisage les n intégrales définies

$$\int_0^a e^{-zx} F(z) dz, \quad \int_0^b e^{-zx} F(z) dz, \dots, \quad \int_0^h e^{-zx} F(z) dz,$$

qu'il est facile d'obtenir sous forme explicite. Faisant, en effet,

$$\mathcal{F}(z) = \frac{F(z)}{x} + \frac{F'(z)}{x^2} + \dots + \frac{F^{(M)}(z)}{x^{M+1}},$$

nous aurons

$$\int e^{-zx} F(z) dz = -e^{-zx} \mathcal{F}(z),$$

et, par conséquent,

$$\int_0^a e^{-zx} F(z) dz = \mathcal{F}(0) - e^{-ax} \mathcal{F}(a), \quad \int_0^b e^{-zx} F(z) dz = \mathcal{F}(0) - e^{-bx} \mathcal{F}(b), \dots$$

Or l'expression de $\mathcal{F}(z)$ donne immédiatement, sous forme de polynômes ordonnés suivant les puissances croissantes de $\frac{1}{x}$, les diverses quantités $\mathcal{F}(0)$, $\mathcal{F}(a)$, $\mathcal{F}(b)$, ..., et si l'on observe qu'on a

$$F(0) = 0, \quad F'(0) = 0, \dots, \quad F^{(\mu-1)}(0) = 0,$$

puis successivement

$$F(a) = 0, \quad F'(a) = 0, \dots, \quad F^{(\mu_1-1)}(a) = 0,$$

$$F(b) = 0, \quad F'(b) = 0, \dots, \quad F^{(\mu_2-1)}(b) = 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

nous en concluons les résultats suivants :

$$\mathcal{F}(0) = \frac{\Phi(x)}{x^{M+1}}, \quad \mathcal{F}(a) = \frac{\Phi_1(x)}{x^{M+1}}, \dots, \quad \mathcal{F}(h) = \frac{\Phi_n(x)}{x^{M+1}},$$

où le polynôme entier $\Phi(x)$ est du degré $M - \mu = m$, et les autres $\Phi_i(x)$,

$\Phi_2(x), \dots, \Phi_n(x)$, des degrés $M - \mu_1, M - \mu_2, \dots, M - \mu_n$. Cela posé, nous écrirons

$$\begin{aligned} e^{ax}\Phi(x) - \Phi_1(x) &= x^{M+1} e^{ax} \int_0^a e^{-zx} F(z) dz, \\ e^{bx}\Phi(x) - \Phi_2(x) &= x^{M+1} e^{bx} \int_0^b e^{-zx} F(z) dz; \\ &\dots\dots\dots, \\ e^{hx}\Phi(x) - \Phi_n(x) &= x^{M+1} e^{hx} \int_0^h e^{-zx} F(z) dz; \end{aligned}$$

or les intégrales définies se développant en séries de la forme $\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \dots$, on voit que les conditions précédemment posées comme définitions du nouveau mode d'approximation des fonctions se trouvent entièrement remplies. Nous avons ainsi obtenu, dans toute sa généralité, le système des fractions rationnelles $\frac{\Phi_1(x)}{\Phi(x)}, \frac{\Phi_2(x)}{\Phi(x)}, \dots, \frac{\Phi_n(x)}{\Phi(x)}$, de même dénominateur, représentant les fonctions $e^{ax}, e^{bx}, \dots, e^{hx}$, aux termes près de l'ordre x^{M+1} .

III. Soit, comme application, $n = 1$, et supposons de plus $\mu = \mu_1 = m$ ce qui donnera $M = 2m$, $F(z) = z^m(z-1)^m$; les dérivées de $F(z)$ pour $z=0$ se tirent sur-le-champ du développement par la formule du binôme

$$F(z) = z^{2m} - \frac{m}{1} z^{2m-1} + \frac{m(m-1)}{1.2} z^{2m-2} - \dots + (-1)^m z^m,$$

et l'on obtient

$$\frac{F^{(2m-k)}(0)}{1.2.3\dots 2m-k} = \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{1.2.3\dots k} (-1)^k,$$

d'où, par suite,

$$\begin{aligned} \frac{\Phi(x)}{1.2.3\dots m} &= 2m(2m-1)\dots(m+1) - (2m-1)(2m-2)\dots(m+1) \frac{m}{1} x \\ &\quad + (2m-2)(2m-3)\dots(m+1) \frac{m(m-1)}{1.2} x^2 - \dots + (-1)^m x^m. \end{aligned}$$

» Pour avoir, en second lieu, les valeurs des dérivées quand on suppose $z=1$, nous poserons $z=1+h$, afin de développer suivant les puissances

de h le polynôme $F(1+h) = h^m(h+1)^m$. Or les coefficients précédemment obtenus se reproduisant, sauf le signe, on voit qu'on aura

$$\Phi_1(x) = \Phi(-x).$$

Ces résultats conduisent à introduire, au lieu de $\Phi(x)$ et $\Phi_1(x)$, les polynômes $\Pi(x) = \frac{\Phi(x)}{1.2.3\dots m}$, $\Pi_1(x) = \frac{\Phi_1(x)}{1.2.3\dots m}$, dont les coefficients sont des nombres entiers; on aura ainsi

$$\begin{aligned} e^x \Pi(x) - \Pi_1(x) &= \frac{x^{2m+1}}{1.2.3\dots m} e^x \int_0^1 e^{zx} z^m (z-1)^m dz \\ &= (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{1.2.3\dots m} \int_0^1 e^{x(1-z)} z^m (1-z)^m dz, \end{aligned}$$

et l'on met en évidence que le premier membre peut devenir, pour une valeur suffisamment grande de m , plus petit que toute quantité donnée.

Nous savons effectivement que le facteur $\frac{x^{2m+1}}{1.2.3\dots m}$ a zéro pour limite, et il en est de même de l'intégrale, la quantité $z^m(1-z)^m$ étant toujours inférieure à son maximum $\left(\frac{1}{2}\right)^m$ qui décroît indéfiniment quand m augmente. Il résulte de là qu'en supposant x un nombre entier, l'exponentielle e^x ne peut avoir une valeur commensurable; car si l'on fait $e^x = \frac{b}{a}$, on parvient, après avoir chassé le dénominateur, à l'égalité

$$b \Pi(x) - a \Pi_1(x) = (-1)^m \frac{a x^{2m+1}}{1.2.3\dots m} \int_0^1 e^{x(1-z)} z^m (1-z)^m dz,$$

dont le second membre peut devenir moindre que toute grandeur donnée, et sans jamais s'évanouir, tandis que le premier est un nombre entier. Lambert, à qui l'on doit cette proposition, ainsi que la seule démonstration jusqu'à ce jour obtenue de l'irrationalité du rapport de la circonférence au diamètre et de son carré, a tiré ces importants résultats de la fraction continue

$$\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{x}{1 + \frac{x^2}{3 + \frac{x^2}{5 + \dots}}}$$

à laquelle nous parviendrons plus tard. Laissant entièrement de côté le rapport de la circonférence au diamètre, je vais maintenant tenter d'aller plus loin à l'égard du nombre e , en établissant l'impossibilité d'une relation de la forme

$$N + e^a N_1 + e^b N_2 + \dots + e^h N_n = 0,$$

$a, b, \dots, h$ étant des nombres entiers, ainsi que les coefficients $N, N_1, \dots, N_n$.

IV. Je considère à cet effet, parmi les divers systèmes de fractions rationnelles $\frac{\Phi_1(x)}{\Phi(x)}, \frac{\Phi_2(x)}{\Phi(x)}, \dots, \frac{\Phi_n(x)}{\Phi(x)}$, celui qu'on obtient lorsqu'on suppose $\mu = \mu_1 = \dots = \mu_n$, ce qui donne

$$m = n\mu, \quad M = (n + 1)\mu \quad \text{et} \quad F(z) = f^\mu(z),$$

en faisant $f(z) = z(z-a)(z-b), \dots, (z-h)$. Soit alors, comme tout à l'heure,

$$\Pi(x) = \frac{\Phi(x)}{1.2.3\dots\mu}, \quad \Pi_1(x) = \frac{\Phi_1(x)}{1.2.3\dots\mu}, \dots, \quad \Pi_n(x) = \frac{\Phi_n(x)}{1.2.3\dots\mu};$$

ces nouveaux polynômes auront encore, pour leurs coefficients, des nombres entiers, et conduiront aux relations suivantes :

[illegible]

en écrivant, pour abrégé,

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \frac{x^{M+1} e^{ax}}{1.2.3\dots\mu} \int_0^a e^{-zx} \mathbf{F}(z) dz = \int_0^a e^{x(a-z)} \frac{f^{(\mu)}(z) x^{(n+1)-\mu+1}}{1.2.3\dots\mu} dz, \\ \varepsilon_2 &= \frac{x^{M+1} e^{bx}}{1.2.3\dots\mu} \int_0^b e^{-zx} \mathbf{F}(z) dz = \int_0^b e^{x(b-z)} \frac{f^{(\mu)}(z) x^{(n+1)-\mu+1}}{1.2.3\dots\mu} dz,\end{aligned}$$

Cela posé, j'observe en premier lieu que $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ deviennent, pour une

valeur suffisamment grande de μ , plus petits que toute quantité donnée; car, le polynôme $f(z)$ ne dépassant jamais une certaine limite λ dans l'intervalle parcouru par la variable, le facteur $\frac{f^\mu(z) x^{(n+1)\mu+1}}{1.2.3 \dots \mu}$, qui multiplie l'exponentielle sous le signe d'intégration, est constamment inférieur à la quantité $\frac{(\lambda x^{n+1})^\mu x}{1.2.3 \dots \mu}$, qui a zéro pour limite.

Je suppose maintenant $x = 1$ dans les équations (A), et désignant alors par P_i la valeur correspondante de $\Pi_i(x)$ qui sera un nombre entier dans l'hypothèse admise à l'égard de $a, b, \dots, h$, elles deviendront

$$\begin{aligned} e^a P - P_1 &= \varepsilon_1, \\ e^b P - P_2 &= \varepsilon_2, \\ &\dots\dots\dots, \\ e^h P - P_n &= \varepsilon_n, \end{aligned}$$

et la relation supposée

$$N + e^a N_1 + e^b N_2 + \dots + e^h N_n = 0$$

donnera facilement celle-ci :

$$NP + N_1 P_1 + \dots + N_n P_n = - (N_1 \varepsilon_1 + N_2 \varepsilon_2 + \dots + N_n \varepsilon_n),$$

dont le premier membre est essentiellement entier, le second, d'après ce qui a été établi relativement à $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ pouvant, lorsque μ augmente, devenir plus petit que toute grandeur donnée. On aura donc nécessairement, à partir d'une certaine valeur de μ et pour toutes les valeurs plus grandes,

$$NP + N_1 P_1 + \dots + N_n P_n = 0.$$

Supposons, en conséquence, que μ devenant successivement $\mu + 1, \mu + 2, \dots, \mu + n$, P_i se change en $P'_i, P''_i, \dots, P^{(n)}_i$, on aura de même

$$\begin{aligned} NP' + N_1 P'_1 + \dots + N_n P'_n &= 0, \\ NP'' + N_1 P''_1 + \dots + N_n P''_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots, \\ NP^{(n)} + N_1 P^{(n)}_1 + \dots + N_n P^{(n)}_n &= 0. \end{aligned}$$

Ces relations entraînent la condition suivante :

$$\begin{vmatrix} P & P_1 & \dots & P_n \\ P' & P'_1 & \dots & P'_n \\ P'' & P''_1 & \dots & P''_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ P^{(n)} & P^{(n)}_1 & \dots & P^{(n)}_n \end{vmatrix} = 0.$$

En prouvant donc que ce déterminant est différent de zéro, on démontrera l'impossibilité de la relation admise

$$N + e^a N_1 + e^b N_2 + \dots + e^h N_n = 0.$$

J'observerai dans ce but qu'on peut substituer aux termes d'une même ligne horizontale des combinaisons linéaires semblables pour toutes ces lignes, et que j'indiquerai en considérant, par exemple, la première. Elle consiste à remplacer respectivement $P, P_1, P_2, \dots, P_{n-1}, P_n$, par $P - e^{-a}P_1, e^{-a}P_1 - e^{-b}P_2, \dots, e^{-g}P_{n-1} - e^{-h}P_n, e^{-h}P_n$; il est alors aisé de voir que, si l'on multiplie toutes ces quantités par $1.2.3 \dots \mu$, elles deviennent précisément les intégrales

$$\int_0^a e^{-z} f^{\mu}(z) dz, \quad \int_a^b e^{-z} f^{\mu}(z) dz, \dots, \quad \int_g^h e^{-z} f^{\mu}(z) dz, \quad \int_h^{\infty} e^{-z} f^{\mu}(z) dz.$$

Maintenant les autres lignes se déduisent de celle-là par le changement de μ en $\mu + 1, \mu + 2, \dots, \mu + n$, et le déterminant transformé sur lequel nous allons raisonner est le suivant :

$$\Delta = \begin{vmatrix} \int_0^a e^{-z} f^{(\mu)}(z) dz, & \int_a^b e^{-z} f^{(\mu)}(z) dz, \dots, & \int_h^\infty e^{-z} f^{(\mu)}(z) dz, \\ \int_0^a e^{-z} f^{(\mu+1)}(z) dz, & \int_a^b e^{-z} f^{(\mu+1)}(z) dz, \dots, & \int_h^\infty e^{-z} f^{(\mu+1)}(z) dz, \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \int_0^a e^{-z} f^{(\mu+n)}(z) dz, & \int_a^b e^{-z} f^{(\mu+n)}(z) dz, \dots, & \int_h^\infty e^{-z} f^{(\mu+n)}(z) dz. \end{vmatrix}$$

V. Nous devons supposer, comme on l'a vu précédemment, que μ est un grand nombre; c'est ce qui conduit à déterminer, au moyen de la belle mé-

thode donnée par Laplace [*De l'intégration par approximation des différentielles qui renferment des facteurs élevés à de grandes puissances dans la Théorie analytique des Probabilités*, p. 88)], l'expression asymptotique des intégrales

$$\int_0^a e^{-z} f^\mu(z) dz, \quad \int_a^b e^{-z} f^\mu(z) dz, \dots, \quad \int_h^\infty e^{-z} f^\mu(z) dz,$$

afin d'en conclure pour Δ une valeur approchée, dont le rapport à la valeur exacte soit l'unité pour μ infini. Admettant, à cet effet, que les nombres entiers $a, b, \dots, h$ soient tous positifs et rangés par ordre croissant de grandeur, de sorte que, dans chaque intégrale, la fonction $e^{-z} f^\mu(z)$, qui s'annule aux limites, ne présente, dans l'intervalle, qu'un seul maximum, je considérerai en premier lieu l'équation

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{1}{\mu},$$

dont dépendent tous ces maxima. Or on sait que ses racines sont réelles et comprises, la première z_1 entre zéro et a , la seconde z_2 entre a et b , et ainsi de suite, la plus grande z_{n+1} étant supérieure à h . Envisagées comme fonctions de μ , il est aisé de voir qu'elles croissent lorsque μ augmente, et qu'en désignant par $p, q, \dots, s$ les racines de l'équation dérivée $f'(z) = 0$, rangées par ordre croissant de grandeur, on aura, si l'on néglige $\frac{1}{\mu^2}$,

$$z_1 = p + \frac{1}{\mu} \frac{f(p)}{f''(p)}, \quad z_2 = q + \frac{1}{\mu} \frac{f(q)}{f''(q)}, \dots, \quad z_n = s + \frac{1}{\mu} \frac{f(s)}{f''(s)},$$

et en dernier lieu $z_{n+1} = (n+1)\mu + \frac{a+b+\dots+h}{n+1}$, une approximation plus grande n'étant pas alors nécessaire. Cela posé, si l'on écrit pour un instant

$$\varphi(z) = \frac{f(z)}{\sqrt{f'(z) - f(z)f''(z)}},$$

les valeurs cherchées seront

$$\sqrt{\frac{2\pi}{\mu}} e^{-z_1} f^\mu(z_1) \varphi(z_1), \quad \sqrt{\frac{2\pi}{\mu}} e^{-z_2} f^\mu(z_2) \varphi(z_2), \dots, \quad \sqrt{\frac{2\pi}{\mu}} e^{-z_{n+1}} f^\mu(z_{n+1}) \varphi(z_{n+1});$$

mais ces quantités se simplifient, comme on va le voir.

en négligeant les termes en $\frac{1}{z}, \frac{1}{z^2}, \dots$, ce qui permet d'écrire

$$\log f(z) = (n+1) \log z, \quad \log \varphi z = \log \frac{z^{n+1}}{\sqrt{(n+1) z^{2n} + \dots}} = \log \frac{z}{\sqrt{n+1}},$$

et, par suite,

$$\log [e^{-z} f^{\mu}(z) \varphi(z)] = (n\mu + \mu + 1) \log z - z - \frac{1}{2} \log (n+1).$$

Après avoir substitué la valeur de z_{n+1} , une réduction facile nous donnera, en faisant, pour abréger,

$$\theta(\mu) = (n\mu + \mu + 1) \log (n+1) \mu - (n+1) \mu - \frac{1}{2} \log (n+1),$$

cette expression semblable à celle des intégrales eulériennes de première espèce

$$\int_h^\infty e^{-z} f^{\mu}(z) dz = \sqrt{\frac{2\pi}{\mu}} e^{\theta(\mu)}.$$

Maintenant on va voir comment les résultats ainsi obtenus conduisent aisément à la valeur du déterminant Δ .

VI. J'effectuerai d'abord une première simplification en supprimant, dans les termes de la ligne horizontale de rang i , le facteur $\sqrt{\frac{2\pi}{\mu+i}}$, puis une seconde, en divisant tous les termes d'une même colonne verticale par le premier d'entre eux. Le nouveau déterminant ainsi obtenu, si l'on fait, pour abréger,

$$P = f(p), \quad Q = f(q), \dots, \quad S = f(s),$$

sera évidemment

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ P & Q & S & e^{\theta(\mu+1)-\theta(\mu)} \\ P^2 & Q^2 & S^2 & e^{\theta(\mu+2)-\theta(\mu)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots\dots\dots \\ P^n & Q^n & S^n & e^{\theta(\mu+n)-\theta(\mu)} \end{vmatrix}.$$

Or on voit que μ ne figure plus que dans une colonne, dont les termes

croissent d'une telle manière que le dernier $e^{\theta(\mu+n)-\theta(\mu)}$ est infiniment plus grand que tous les autres. Nous avons en effet

$$\begin{aligned}\theta(\mu+i) &= \theta(\mu) + i\theta'(\mu) + \frac{i^2}{2}\theta''(\mu) + \dots \\ &= \theta(\mu) + i\left[\frac{1}{\mu} + (n+1)\log(n+1)\mu\right] + \frac{i^2}{2}\left(-\frac{1}{\mu^2} + \frac{n+1}{\mu}\right) + \dots,\end{aligned}$$

et par conséquent, si l'on néglige $\frac{1}{\mu}, \frac{1}{\mu^2}, \dots$,

$$\theta(\mu+i) - \theta(\mu) = i(n+1)\log(n+1)\mu,$$

d'où

$$e^{\theta(\mu+i)-\theta(\mu)} = [(n+1)\mu]^{i(n+1)}.$$

En ne conservant donc dans le déterminant que le terme en μ de l'ordre le plus élevé, il se réduit simplement à cette expression

$$[(n+1)\mu]^{n(n+1)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ P & Q & S \\ P^2 & Q^2 & S^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P^{n-1} & Q^{n-1} & S^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Il en résulte qu'on ne peut, en général, admettre que le déterminant proposé Δ s'annule, car les quantités $P=f(p)$, $Q=f(q), \dots$, fonctions entières semblables des racines $p, q, \dots$, de l'équation dérivée $f'(x)=0$ seront comme ces racines différentes entre elles. C'est ce qu'il fallait établir pour démontrer l'impossibilité de toute relation de la forme

$$N + e^a N_1 + e^b N_2 + \dots + e^h N_n = 0,$$

et arriver ainsi à prouver que *le nombre e ne peut être racine d'une équation algébrique de degré quelconque à coefficients entiers.*

Mais une autre voie conduira à une seconde démonstration plus rigoureuse; on peut en effet, comme on va le voir, étendre aux fractions rationnelles

$$\frac{\Phi_1(x)}{\Phi(x)}, \quad \frac{\Phi_2(x)}{\Phi(x)}, \quad \dots, \quad \frac{\Phi_n(x)}{\Phi(x)}$$

les coefficients $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{L}$ étant indépendants de z , et $\Theta(z)$ un polynôme entier divisible par $f(z)$. Si l'on fait, en effet,

$$\mathfrak{F}_k(z) = \frac{F_k(z)}{x} + \frac{F'_k(z)}{x^2} + \frac{F''_k(z)}{x^3} + \dots,$$

on aura

$$\begin{aligned} & \mathfrak{a} \int e^{-zx} F(z) dz + \mathfrak{b} \int e^{-zx} F_1(z) dz + \dots + \mathfrak{L} \int e^{-zx} F_{n+1}(z) dz \\ &= -e^{-zx} [\mathfrak{a} \mathfrak{F}(z) + \mathfrak{b} \mathfrak{F}_1(z) + \dots + \mathfrak{L} \mathfrak{F}_{n+1}(z)], \end{aligned}$$

et il est clair que les rapports $\frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}, \frac{\mathfrak{c}}{\mathfrak{a}}, \dots, \frac{\mathfrak{L}}{\mathfrak{a}}$ pourront être déterminés, et d'une seule manière, par la condition supposée que le polynôme

$$\Theta(z) = -[\mathfrak{a} \mathfrak{F}(z) + \mathfrak{b} \mathfrak{F}_1(z) + \dots + \mathfrak{L} \mathfrak{F}_{n+1}(z)]$$

contienne comme facteur $f(z) = z(z-a)(z-b)\dots(z-h)$. Nous concluons de là en prenant les intégrales entre les limites $z=0$ et $z=a$, par exemple

$$\mathfrak{a} \int_0^a e^{-zx} F(z) dz + \mathfrak{b} \int_0^a e^{-zx} F_1(z) dz + \dots + \mathfrak{L} \int_0^a e^{-zx} F_{n+1}(z) dz = 0.$$

Maintenant les relations

$$\begin{aligned} \int_0^a e^{-zx} F(z) dz &= \frac{e^{ax} \Phi(x) - \Phi_1(x)}{e^{ax} x^{M+1}}, \\ \int_0^a e^{-zx} F_1(z) dz &= \frac{e^{ax} \Phi'_1(x) - \Phi'_1(x)}{e^{ax} x^{M_1+1}}, \dots \end{aligned}$$

donneront, en égalant séparément à zéro le terme algébrique et le coefficient de l'exponentielle e^{ax} , si l'on fait, pour abréger,

$$A = \frac{\mathfrak{a}}{x^{M+1}}, \quad B = \frac{\mathfrak{b}}{x^{M_1+1}}, \dots, \quad L = \frac{\mathfrak{L}}{x^{M_{n+1}+1}},$$

les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} A \Phi(x) + B \Phi'_1(x) + \dots + L \Phi^{n+1}(x) &= 0, \\ A \Phi_1(x) + B \Phi'_1(x) + \dots + L \Phi^{n+1}_1(x) &= 0. \end{aligned}$$

Or on aura de même, en prenant pour limites supérieures des intégrales $z = b, c, \dots, h$,

$$A\Phi_2(x) + B\Phi_2^1(x) + \dots + L\Phi_2^{n+1}(x) = 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$A\Phi_n(x) + B\Phi_n^1(x) + \dots + L\Phi_n^{n+1}(x) = 0,$$

et il est aisé de voir que les coefficients $A, B, \dots, L$ pourront être supposés des polynômes entiers en x . L'intégrale $\int_0^1 e^{-zx} z^m (z-1)^m dz$, qui figure dans la relation précédemment considérée (page 5),

$$e^x \Pi(x) - \Pi_1(x) = \frac{x^{m+1} e^x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m} \int_0^1 e^{-zx} z^m (z-1)^m dz,$$

nous servira d'abord d'exemple.

VIII. Dans ce cas facile, où l'on a simplement

$$f(z) = z(z-1),$$

je partirai, en supposant

$$\Theta(z) = x f^{m+1}(z) + (m+1) f^m(z) f'(z),$$

de l'identité suivante :

$$\begin{aligned} \frac{d[e^{-zx} \Theta(z)]}{dz} &= e^{-zx} [\Theta'(z) - x \Theta(z)] \\ &= e^{-zx} [-x^2 f^{m+1}(z) + (m+1) f^m(z) f''(z) + m(m+1) f^{m-1}(z) f'^2(z)], \end{aligned}$$

et j'observerai que

$$f'^2(z) = 4z^2 - 4z + 1 = 4f(z) + 1, \quad f''(z) = 2,$$

ce qui permet de l'écrire ainsi :

$$\frac{d[e^{-zx} \Theta(z)]}{dx} = e^{-zx} [-x^2 f^{m+1}(z) + (2m+1)(2m+2) f^m(z) + m(m+1) f^{m-1}(z)].$$

Nous aurons donc, en intégrant,

$$e^{-zx}\Theta(z) = -x^2 \int e^{-zx} f^{m+1}(z) dz + (2m+1)(2m+2) \int e^{-zx} f^m(z) dz \\ + m(m+1) \int e^{-zx} f^{m-1}(z) dz,$$

et ensuite, si nous prenons pour limites $z=0$ et $z=1$,

$$x^2 \int_0^1 e^{-zx} f^{m+1}(z) dz = (2m+1)(2m+2) \int_0^1 e^{-zx} f^m(z) dz \\ + m(m+1) \int_0^1 e^{-zx} f^{m-1}(z) dz.$$

Soit maintenant

$$\varepsilon_m = \frac{x^{2m+1}e^x}{1.2\dots m} \int_0^1 e^{-zx} z^m (z-1)^m dz,$$

et cette relation deviendra

$$\varepsilon_{m+1} = (4m+2)\varepsilon_m + x^2\varepsilon_{m-1}.$$

C'est le résultat auquel nous voulions parvenir; en y supposant successivement $m=1, 2, 3, \dots$, les équations qu'on en tire

$$\varepsilon_2 = 6\varepsilon_1 + x^2\varepsilon_0,$$

$$\varepsilon_3 = 10\varepsilon_2 + x^2\varepsilon_1,$$

$$\varepsilon_4 = 14\varepsilon_3 + x^2\varepsilon_2,$$

$$\dots\dots\dots$$

donnent aisément la fraction continue

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} = - \frac{x^2}{6 + \frac{x^2}{10 + \frac{x^2}{14} + \dots}},$$

et il suffit d'employer les valeurs

$$\varepsilon_0 = xe^x \int_0^1 e^{-zx} dz = e^x - 1,$$

$$\varepsilon_1 = x^3 e^x \int_0^1 e^{-zx} z(z-1) dz = e^x(2-x) - 2+x,$$

d'où l'on conclut

$$\frac{z_1}{z_0} = 2 - \frac{e^x + 1}{e^x - 1} x,$$

pour retrouver, sauf le changement de x en $\frac{x}{2}$, le résultat de Lambert (*)

$$\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{x}{2 + \frac{x^2}{6 + \frac{x^2}{10 + \frac{x^2}{14} + \dots}}}$$

En abordant maintenant le cas général et me proposant d'obtenir, à l'égard des intégrales définies

$$\int_0^a e^{-z} f^m(z) dz, \quad \int_0^b e^{-z} f^m(z) dz, \dots, \quad \int_0^h e^{-z} f^m(z) dz,$$

un algorithme qui permette de les calculer de proche en proche, pour toutes les valeurs du nombre entier m , j'introduirai, afin de rendre les calculs plus symétriques, les modifications suivantes dans les notations précédemment admises. Je ferai

$$f(z) = (z - z_0)(z - z_1) \dots (z - z_n),$$

au lieu de

$$f(z) = z(z - a)(z - b) \dots (z - h),$$

de manière à considérer le polynôme le plus général de degré $n + 1$; désignant ensuite par Z l'une quelconque des quantités $z_1, z_2, \dots, z_n$, je raisonnerai sur l'intégrale

$$\int_{z_0}^Z e^{-z} f^m(z) dz,$$

qui donnera évidemment toutes celles que nous avons en vue, en faisant $z_0 = 0$. Cela étant, voici la remarque qui m'a ouvert la voie et conduit à la méthode que je vais exposer.

(*) Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques (*Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin*, année 1761, p. 265). Voir aussi la Note IV des *Éléments de Géométrie* de Legendre, p. 288.

IX. En intégrant les deux membres de la relation identique

$$\frac{d[e^{-z}f^m(z)]}{dz} = e^{-z} [mf^{m-1}(z)f'(z) - f^m(z)],$$

on obtient

$$e^{-z}f^m(z) = m \int e^{-z}f^{m-1}(z)f'(z) dz - \int e^{-z}f^m(z) dz,$$

et, par conséquent,

$$\int_{z_0}^Z e^{-z}f^m(z) dz = m \int_{z_0}^Z e^{-z}f^{m-1}(z)f'(z) dz,$$

ou encore

$$\int_{z_0}^Z e^{-z}f^m(z) dz = m \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_0} dz + m \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots + m \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_n} dz,$$

d'après la formule

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{1}{z - z_0} + \frac{1}{z - z_1} + \dots + \frac{1}{z - z_n}.$$

Or ce sont ces nouvelles intégrales

$$\int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_0} dz, \quad \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_1} dz, \dots, \quad \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_n} dz$$

qui donnent lieu à un système de relations récurrentes de la forme

$$\begin{aligned} \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^{m+1}(z)}{z - z_0} dz &= (00) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_0} dz \\ &\quad + (01) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots + (0n) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_n} dz, \\ \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^{m+1}(z)}{z - z_1} dz &= (10) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_0} dz \\ &\quad + (11) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots + (1n) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_n} dz, \\ &\dots\dots\dots, \\ \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^{m+1}(z)}{z - z_n} dz &= (n0) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_0} dz \\ &\quad + (n1) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots + (nn) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z}f^m(z)}{z - z_n} dz, \end{aligned}$$

où les coefficients (ik) , ainsi que leur déterminant, s'obtiennent d'une manière facile, comme nous verrons.

C'est donc en opérant sur les éléments au nombre de $n+1$, dans lesquels a été décomposée l'intégrale $\int_{z_0}^Z e^{-z} f^m(z) dz$, que nous parvenons à sa détermination, au lieu de chercher, comme une analogie naturelle aurait paru l'indiquer, une expression linéaire de $\int_{z_0}^Z e^{-z} f^{m+n+1}(z) dz$, au moyen de

$$\int_{z_0}^Z e^{-z} f^m(z) dz, \quad \int_{z_0}^Z e^{-z} f^{m+1}(z) dz, \dots, \quad \int_{z_0}^Z e^{-z} f^{m+n}(z) dz.$$

Mais, soit d'une manière plus générale, pour des valeurs entières quelconques des exposants,

$$F(z) = (z - z_0)^{\mu_0} (z - z_1)^{\mu_1} \dots (z - z_n)^{\mu_n};$$

en intégrant les deux membres de l'identité

$$\frac{d[e^{-z} F(z)]}{dz} = e^{-z} [F'(z) - F(z)],$$

on aura

$$e^{-z} F(z) = \int e^{-z} F'(z) dz - \int e^{-z} F(z) dz,$$

d'où

$$\int_{z_0}^Z e^{-z} F(z) dz = \int_{z_0}^Z e^{-z} F'(z) dz.$$

Maintenant la formule

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \frac{\mu_0}{z - z_0} + \frac{\mu_1}{z - z_1} + \dots + \frac{\mu_n}{z - z_n}$$

donne la décomposition suivante :

$$\int_{z_0}^Z e^{-z} F(z) dz = \mu_0 \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z) dz}{z - z_0} + \mu_1 \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z) dz}{z - z_1} + \dots + \mu_n \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z) dz}{z - z_n},$$

qui conduira pareillement au calcul des divers termes de la suite

$$\int_{z_0}^z e^{-z} F(z) dz, \quad \int_{z_0}^z e^{-z} F(z) f'(z) dz, \dots, \quad \int_{z_0}^z e^{-z} F(z) f^k(z) dz;$$

effectivement, les éléments de décomposition de l'un quelconque d'entre eux s'expriment en fonction linéaire des quantités semblables qui se rapportent au terme précédent, ainsi qu'on va le montrer.

X. J'établirai pour cela qu'on peut toujours déterminer deux polynômes entiers de degré n , $\Theta(z)$ et $\Theta_1(z)$, tels qu'on ait, en désignant par ζ l'une des racines $z_0, z_1, \dots, z_n$, la relation suivante :

$$\int \frac{e^{-z} F(z) f(z)}{z - \zeta} dz = \int \frac{e^{-z} F(z) \Theta_1(z)}{f(z)} dz - e^{-z} F(z) \Theta(z).$$

En effet, si, après avoir différentié les deux membres, nous multiplions par le facteur $\frac{f(z)}{F(z)}$, il vient

$$\frac{f(z)}{z - \zeta} f(z) = \Theta_1(z) + \left[1 - \frac{F'(z)}{F(z)} \right] f(z) \Theta(z) - f(z) \Theta'(z).$$

Or $f(z)$ étant divisible par $z - \zeta$, le premier membre de cette égalité est un polynôme entier de degré $2n + 1$; le second est du même degré, d'après la supposition admise à l'égard de $\Theta(z)$ et $\Theta_1(z)$, et, puisque chacun de ces polynômes renferme ainsi $n + 1$ coefficients indéterminés, on a bien le nombre nécessaire égal à $2n + 2$ de constantes arbitraires pour effectuer l'identification. Ce point établi, j'observe qu'en supposant $z = z_i$ la fraction rationnelle $\frac{F'(z)f(z)}{F(z)}$ a pour valeur $\mu_i f'(z_i)$; on a, par conséquent, ces conditions

$$\begin{aligned} \Theta_1(z_0) &= \mu_0 f'(z_0) \Theta(z_0), \\ \Theta_1(z_1) &= \mu_1 f'(z_1) \Theta(z_1), \\ &\dots\dots\dots, \\ \Theta_1(z_n) &= \mu_n f'(z_n) \Theta(z_n), \end{aligned}$$

qui permettent, par la formule d'interpolation, de calculer immédiatement

$\Theta_1(z)$, lorsque $\Theta(z)$ sera connu. Nous avons de cette manière, en effet, l'expression suivante :

$$\frac{\Theta_1(z)}{f(z)} = \frac{\mu_0 \Theta(z_0)}{z - z_0} + \frac{\mu_1 \Theta(z_1)}{z - z_1} + \dots + \frac{\mu_n \Theta(z_n)}{z - z_n},$$

dont nous ferons bientôt usage. Pour obtenir maintenant $\Theta(z)$, je reprends la relation proposée, en divisant les deux membres par $f(z)$, ce qui donne

$$\frac{f(z)}{z - \zeta} = \frac{\Theta_1(z)}{f(z)} + \left[1 - \frac{F'(z)}{F(z)} \right] \Theta(z) - \Theta'(z),$$

et je remarque que, la fraction $\frac{\Theta_1(z)}{f(z)}$ n'ayant pas de partie entière, on est amené à cette conséquence, que le polynôme cherché doit être tel que la partie entière de l'expression

$$\left[1 - \frac{F'(z)}{F(z)} \right] \Theta(z) - \Theta'(z)$$

soit égale au quotient $\frac{f(z)}{z - \zeta}$. C'est ce qui conduit aisément à la détermination de $\Theta(z)$. Soit d'abord, à cet effet,

$$f(z) = z^{n+1} + p_1 z^n + p_2 z^{n-1} + \dots + p_{n+1},$$

ce qui donnera

$$\begin{array}{rcl} \frac{f(z)}{z - \zeta} = z^n + \zeta & \left| \begin{array}{l} z^{n-1} + \zeta^2 \\ + p_1 \zeta \\ + p_2 \end{array} \right| & \begin{array}{l} z^{n-2} + \dots + \zeta^n \\ + p_1 \zeta^{n-1} \\ + p_2 \zeta^{n-2} \\ \vdots \\ + p_n \end{array} \end{array}$$

ou plutôt

$$\frac{f(z)}{z - \zeta} = z^n + \zeta_1 z^{n-1} + \zeta_2 z^{n-2} + \dots + \zeta_n,$$

en écrivant, pour abréger,

$$\zeta_i = \zeta^i + p_1 \zeta^{i-1} + p_2 \zeta^{i-2} + \dots + p_i.$$

Soit encore

$$\Theta(z) = \alpha_0 z^n + \alpha_1 z^{n-1} + \alpha_2 z^{n-2} + \dots + \alpha_n,$$

et développons la fonction $\frac{F'(z)}{F(z)}$ suivant les puissances descendantes de la variable, afin d'obtenir la partie entière du produit $\frac{F'(z)}{F(z)} \Theta(z)$. Il viendra ainsi, en posant $s_i = \mu_0 z_0^i + \mu_1 z_1^i + \mu_2 z_2^i + \dots + \mu_n z_n^i$,

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \frac{s_0}{z} + \frac{s_1}{z^2} + \frac{s_2}{z^3} + \dots,$$

et, par conséquent,

$$\frac{F'(z)}{F(z)} \Theta(z) = \alpha_0 s_0 z^{n-1} + \alpha_1 s_0 \left| \begin{array}{c} z^{n-2} + \alpha_2 s_0 \\ + \alpha_1 s_1 \end{array} \right| z^{n-3} + \dots$$

Les équations en $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$, auxquelles nous sommes amené par l'identification, sont donc

$$\begin{aligned} 1 &= \alpha_0, \\ \zeta_1 &= \alpha_1 - \alpha_0 (s_0 + n), \\ \zeta_2 &= \alpha_2 - \alpha_1 (s_0 + n - 1) - \alpha_0 s_1, \\ \zeta_3 &= \alpha_3 - \alpha_2 (s_0 + n - 2) - \alpha_1 s_1 - \alpha_0 s_2, \\ &\dots \end{aligned}$$

Elles donnent

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= 1, \\ \alpha_1 &= \zeta_1 + s_0 + n, \\ \alpha_2 &= \zeta_2 + (s_0 + n - 1)\zeta_1 + (s_0 + n)(s_0 + n - 1) + s_1, \\ &\dots \end{aligned}$$

et montrent que $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ sont des polynômes en ζ ayant pour coefficients des fonctions entières et à coefficients entiers de $s_0, s_1, s_2, \dots$ et par suite des racines $z_0, z_1, \dots, z_n$. On voit de plus que α_i est un polynôme de degré i dans lequel le coefficient de ζ^i est égal à l'unité; ainsi, en posant pour plus de clarté

$$\alpha_i = \theta_i(\zeta),$$

et écrivant désormais $\Theta(z, \zeta)$ au lieu de $\Theta(z)$, afin de mettre ζ en évidence, nous aurons

$$\Theta(z, \zeta) = z^n + \theta_1(\zeta) z^{n-1} + \theta_2(\zeta) z^{n-2} + \dots + \theta_n(\zeta).$$

De là résulte, pour le polynôme $\Theta_1(z)$, la formule

$$\frac{\Theta_1(z)}{f'(z)} = \frac{\mu_0 \Theta(z_0, \zeta)}{z - z_0} + \frac{\mu_1 \Theta(z_1, \zeta)}{z - z_1} + \dots + \frac{\mu_n \Theta(z_n, \zeta)}{z - z_n},$$

et l'on en tire immédiatement le résultat que nous nous sommes proposé d'obtenir. Il suffit en effet de prendre les intégrales entre les limites z_0 et Z dans la relation

$$\int \frac{e^{-z} F(z) f'(z)}{z - \zeta} dz = \int \frac{e^{-z} F(z) \Theta_1(z)}{f'(z)} dz - e^{-z} F(z) \Theta(z),$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z) f'(z)}{z - \zeta} dz &= \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z) \Theta_1(z)}{f'(z)} dz \\ &= \mu_0 \Theta(z_0, \zeta) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z)}{z - z_0} dz, \\ &+ \mu_1 \Theta(z_1, \zeta) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z)}{z - z_1} dz, \\ &\dots\dots\dots \\ &+ \mu_n \Theta(z_n, \zeta) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} F(z)}{z - z_n} dz. \end{aligned}$$

C'est surtout dans le cas où l'on suppose

$$\mu_0 = \mu_1 = \dots = \mu_n = m,$$

que nous ferons usage de cette équation ; si l'on fait alors

$$m \Theta(z_i, z_k) = (ik)$$

et qu'on prenne ζ successivement égal à $z_0, z_1, \dots, z_n$, on en conclut, comme on voit, les relations précédemment énoncées, qui résultent de celle-ci :

$$\begin{aligned} \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^{m+1}(z)}{z - z_i} dz &= (i0) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_0} dz + (i1) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots \\ &+ (in) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_n} dz, \end{aligned}$$

pour $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Je resterai encore cependant dans le cas général pour établir la proposition suivante.

« X. Soient Δ et δ les déterminants

$$\begin{vmatrix} \Theta(z_0, z_0) & \Theta(z_1, z_0) \dots & \Theta(z_n, z_0) \\ \Theta(z_0, z_1) & \Theta(z_1, z_1) \dots & \Theta(z_n, z_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ \Theta(z_0, z_n) & \Theta(z_1, z_n) \dots & \Theta(z_n, z_n) \end{vmatrix}$$

et

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \dots & 1 \\ z_0 & z_1 \dots & z_n \\ z_0^2 & z_1^2 \dots & z_n^2 \\ \dots & \dots & \dots \\ z_0^n & z_1^n \dots & z_n^n \end{vmatrix};$$

je dis qu'on a

$$\Delta = \delta^2.$$

Effectivement, l'expression de $\Theta(z, \zeta)$ sous la forme

$$\Theta(z, \zeta) = z^n + \theta_1(\zeta) z^{n-1} + \theta_2(\zeta) z^{n-2} + \dots + \theta_n(\zeta)$$

montre que Δ est le produit des deux déterminants

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \dots & 1 \\ z_0 & z_1 \dots & z_n \\ z_0^2 & z_1^2 \dots & z_n^2 \\ \dots & \dots & \dots \\ z_0^n & z_1^n \dots & z_n^n \end{vmatrix}$$

et

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \dots & 1 \\ \theta_1(z_0) & \theta_1(z_1) \dots & \theta_1(z_n) \\ \theta_2(z_0) & \theta_2(z_1) \dots & \theta_2(z_n) \\ \dots & \dots & \dots \\ \theta_n(z_0) & \theta_n(z_1) \dots & \theta_n(z_n) \end{vmatrix}.$$

Mais $\theta_i(\zeta)$ étant un polynôme en ζ du degré i seulement, de sorte qu'on peut faire

$$\theta_i(\zeta) = \zeta^i + r\zeta^{i-1} + s\zeta^{i-2} + \dots;$$

cette seconde quantité, d'après les théorèmes connus, se réduit simplement à la première, et l'on a bien, comme nous voulions l'établir,

$$\Delta = \delta^2.$$

Cela posé, soient

$$\varepsilon_m = \frac{1}{1.2\dots m} \int_{z_0}^Z e^{-z} f^m(z) dz,$$

$$\varepsilon_m^i = \frac{1}{1.2\dots m-1} \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_i} dz;$$

la relation établie page 18

$$\int_{z_0}^Z e^{-z} f^m(z) dz = m \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_0} dz + m \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots$$

$$+ m \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_n} dz$$

deviendra plus simplement

$$\varepsilon_m = \varepsilon_m^0 + \varepsilon_m^1 + \dots + \varepsilon_m^n;$$

et celle-ci :

$$\int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^{m+1}(z)}{z - \zeta} dz = m \Theta(z_0, \zeta) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_0} dz + m \Theta(z_1, \zeta) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_1} dz + \dots$$

$$+ m \Theta(z_n, \zeta) \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f^m(z)}{z - z_n} dz,$$

en supposant successivement $\zeta = z_0, z_1, \dots, z_n$, nous donnera la substitution suivante que je désignerai par S_m , à savoir

$$\varepsilon_{m+1}^0 = \Theta(z_0, z_0) \varepsilon_m^0 + \Theta(z_1, z_0) \varepsilon_m^1 + \dots + \Theta(z_n, z_0) \varepsilon_m^n,$$

$$\varepsilon_{m+1}^1 = \Theta(z_0, z_1) \varepsilon_m^0 + \Theta(z_1, z_1) \varepsilon_m^1 + \dots + \Theta(z_n, z_1) \varepsilon_m^n,$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$\varepsilon_{m+1}^n = \Theta(z_0, z_n) \varepsilon_m^0 + \Theta(z_1, z_n) \varepsilon_m^1 + \dots + \Theta(z_n, z_n) \varepsilon_m^n.$$

Si l'on compose maintenant de proche $S_1, S_2, \dots, S_{m-1}$, on en déduira les

H.

$\varepsilon_m^1, \dots, \varepsilon_m^n$. On obtient ainsi les équations

$$\begin{aligned}\eta_k^0 &= e^{-z_0} \mathfrak{A}_0 - e^{-z_k} \mathfrak{A}_k, \\ \eta_k^1 &= e^{-z_0} \mathfrak{B}_0 - e^{-z_k} \mathfrak{B}_k, \\ . &\quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \\ \eta_k^n &= e^{-z_0} \mathfrak{L}_0 - e^{-z_k} \mathfrak{L}_k,\end{aligned}$$

qui vont nous conduire à la seconde démonstration que j'ai annoncée de l'impossibilité d'une relation de la forme

$$e^{z_0} N_0 + e^{z_1} N_1 + \dots + e^{z_n} N_n = 0,$$

les exposants $z_0, z_1, \dots, z_n$ étant supposés entiers, ainsi que les coefficients $N_0, N_1, \dots, N_n$.

XIII. Je dis en premier lieu que ε_m^i peut devenir plus petit que toute quantité donnée, pour une valeur suffisamment grande de m . Effectivement, l'exponentielle e^{-z} étant toujours positive, on a, comme on sait,

$$\int_{z_0}^Z e^{-z} F(z) dz = F(\xi) \int_{z_0}^Z e^{-z} dz = F(\xi)(e^{-z_0} - e^{-Z}),$$

$F(z)$ étant une fonction quelconque et ξ une quantité comprise entre les limites z_0 et Z de l'intégrale. Or, en supposant

$$F(z) = \frac{f^m(z)}{z - z_i},$$

on aura cette expression

$$\varepsilon_m^i = \frac{f^{m-1}(\xi)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m - 1} \frac{f(\xi)}{\xi - z_j} (e^{-z_0} - e^{-z}),$$

qui met en évidence la propriété énoncée. Cela posé, je tire des équations

$$\begin{aligned} \eta_1^0 &= e^{-z_0} \mathfrak{L}_0 - e^{-z_1} \mathfrak{L}_1, \\ \eta_2^0 &= e^{-z_0} \mathfrak{L}_0 - e^{-z_2} \mathfrak{L}_2, \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \\ \eta_n^0 &= e^{-z_0} \mathfrak{L}_0 - e^{-z_n} \mathfrak{L}_n \end{aligned}$$

$$e^{z_0} N_0 + e^{z_1} N_1 + \dots + e^{z_n} N_n = 0$$

a pour conséquence que le déterminant

$$\Delta = \begin{vmatrix} \mathfrak{A}_0 & \mathfrak{A}_1 & \dots & \mathfrak{A}_n \\ \mathfrak{B}_0 & \mathfrak{B}_1 & \dots & \mathfrak{B}_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathfrak{L}_0 & \mathfrak{L}_1 & \dots & \mathfrak{L}_n \end{vmatrix}$$

doit nécessairement être nul. Mais, d'après les expressions des quantités $\mathfrak{A}_k, \mathfrak{B}_k, \dots, \mathfrak{L}_k$, Δ est le produit de ces deux autres déterminants

$$\begin{vmatrix} A_0 & A_1 & \dots & A_n \\ B_0 & B_1 & \dots & B_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ L_0 & L_1 & \dots & L_n \end{vmatrix},$$

et

$$\begin{vmatrix} \Phi(z_0, z_0) & \Phi(z_1, z_0) \dots & \Phi(z_n, z_0) \\ \Phi(z_0, z_1) & \Phi(z_1, z_1) \dots & \Phi(z_n, z_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ \Phi(z_0, z_n) & \Phi(z_1, z_n) \dots & \Phi(z_n, z_n) \end{vmatrix},$$

dont le premier a pour valeur $\delta^{2(m-1)}$, et le second δ^2 . On a donc $\Delta = \delta^{2m}$, et il est ainsi démontré, d'une manière entièrement rigoureuse, que la relation supposée est impossible, et que, par suite, le nombre e n'est point compris dans les irrationnelles algébriques.

XIV. Il ne sera pas inutile de donner quelques exemples du mode d'approximation des quantités auquel nous avons été conduits, et je considérerai d'abord le cas le plus simple, où l'on ne considère que la seule exponentielle e^x . En faisant alors $f(z) = z(z-x)$, nous aurons

$$\varepsilon_m = \frac{1}{1.2 \dots m} \int_0^x e^{-z} z^m (z-x)^m dz$$

et

$$\begin{aligned} \varepsilon_m^0 &= \frac{1}{1.2 \dots m-1} \int_0^x e^{-z} z^{m-1} (z-x)^m dz, \\ \varepsilon_m^1 &= \frac{1}{1.2 \dots m-1} \int_0^x e^{-z} z^m (z-x)^{m-1} dz. \end{aligned}$$

Or on obtient immédiatement

$$\Theta(z, \zeta) = z + \zeta + 2m + 1 - x,$$

d'où

$$\begin{aligned}\Theta(0, 0) &= 2m + 1 - x, & \Theta(x, 0) &= 2m + 1, \\ \Theta(0, x) &= 2m + 1, & \Theta(x, x) &= 2m + 1 + x,\end{aligned}$$

et, par conséquent, ces relations

$$\begin{aligned}\varepsilon_{m+1}^0 &= (2m + 1 - x) \varepsilon_m^0 + (2m + 1) \varepsilon_m^1, \\ \varepsilon_{m+1}^1 &= (2m + 1) \varepsilon_m^0 + (2m + 1 + x) \varepsilon_m^1.\end{aligned}$$

J'observerai maintenant qu'il vient, en retranchant membre à membre,

$$\varepsilon_{m+1}^1 - \varepsilon_{m+1}^0 = x (\varepsilon_m^0 + \varepsilon_m^1),$$

de sorte que, ayant

$$\varepsilon_m = \varepsilon_m^0 + \varepsilon_m^1,$$

on en conclut

$$\varepsilon_{m+1}^1 - \varepsilon_{m+1}^0 = x \varepsilon_m.$$

Joignons à cette équation la suivante :

$$\varepsilon_{m+1}^1 + \varepsilon_{m+1}^0 = \varepsilon_{m+1},$$

nous en déduirons les valeurs

$$\varepsilon_{m+1}^1 = \frac{\varepsilon_{m+1} + x \varepsilon_m}{2}, \quad \varepsilon_{m+1}^0 = \frac{\varepsilon_{m+1} - x \varepsilon_m}{2},$$

et, si l'on y change m en $m - 1$, une simple substitution, par exemple, dans la relation

$$\varepsilon_{m+1}^0 = (2m + 1 - x) \varepsilon_m^0 + (2m + 1) \varepsilon_m^1,$$

donnera le résultat précédemment obtenu (p. 16),

$$\varepsilon_{m+1} = (4m + 2) \varepsilon_m + x^2 \varepsilon_{m-1}.$$

» Soient, en second lieu, $n=2$, $z_0=0$, $z_1=1$, $z_2=2$, d'où
 $f(z) = z(z-1)(z-2) = z^3 - 3z^2 + 2z$, on trouvera

$$\Theta(z, \zeta) = z^2 + (\zeta - 1)z + (\zeta - 1)^2 + 3m(z + \zeta + 1) + 9m^2,$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} \Theta(0,0) &= 9m^2 + 3m + 1, & \Theta(0,1) &= 9m^2 + 6m, & \Theta(0,2) &= 9m^2 + 9m + 1, \\ \Theta(1,0) &= 9m^2 + 6m + 1, & \Theta(1,1) &= 9m^2 + 9m + 1, & \Theta(1,2) &= 9m^2 + 12m + 3, \\ \Theta(2,0) &= 9m^2 + 9m + 3, & \Theta(2,1) &= 9m^2 + 12m + 4, & \Theta(2,2) &= 9m^2 + 15m + 7. \end{aligned}$$

En particulier, pour $m=1$, nous aurons

$$\begin{aligned} \varepsilon_2^0 &= 13\varepsilon_1^0 + 16\varepsilon_1^1 + 21\varepsilon_1^2, \\ \varepsilon_2^1 &= 15\varepsilon_1^0 + 19\varepsilon_1^1 + 25\varepsilon_1^2, \\ \varepsilon_2^2 &= 19\varepsilon_1^0 + 24\varepsilon_1^1 + 31\varepsilon_1^2; \end{aligned}$$

d'ailleurs il vient facilement

$$\Phi(z, \zeta) = z^2 + (\zeta - 1)z + (\zeta - 1)^2,$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} \varepsilon_1^0 &= 1 - e^{-Z}(Z^2 - Z + 1), \\ \varepsilon_1^1 &= -e^{-Z}Z^2, \\ \varepsilon_1^2 &= 1 - e^{-Z}(Z^2 + Z + 1); \end{aligned}$$

on en conclut

$$\begin{aligned} \varepsilon_2^0 &= 34 - e^{-Z}(50Z^2 + 8Z + 34), \\ \varepsilon_2^1 &= 40 - e^{-Z}(59Z^2 + 10Z + 40), \\ \varepsilon_2^2 &= 50 - e^{-Z}(74(Z^2 + 12Z + 50)). \end{aligned}$$

De là résulte que

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varepsilon_1^0 + \varepsilon_1^1 + \varepsilon_1^2 = 2 - e^{-Z}(3Z^2 + 2), \\ \varepsilon_2 &= \varepsilon_2^0 + \varepsilon_2^1 + \varepsilon_2^2 = 124 - e^{-Z}(183Z^2 + 30Z + 124); \end{aligned}$$

et si l'on fait successivement $Z=1$, $Z=2$, l'expression de ε_i fournit les valeurs approchées

$$e = \frac{5}{2}, \quad e^2 = \frac{14}{2} = 7,$$

(33)

et l'expression de ε_2 les suivantes :

$$e = \frac{337}{124}, \quad e^2 = \frac{916}{124},$$

où l'erreur ne porte que sur les dix-millièmes. En supposant ensuite $m = 2$, ce qui donnera

$$\begin{aligned}\varepsilon_3^0 &= 43\varepsilon_2^0 + 49\varepsilon_2^1 + 57\varepsilon_2^2, \\ \varepsilon_3^1 &= 48\varepsilon_2^0 + 55\varepsilon_2^1 + 64\varepsilon_2^2, \\ \varepsilon_3^2 &= 55\varepsilon_2^0 + 63\varepsilon_2^1 + 75\varepsilon_2^2,\end{aligned}$$

nous obtiendrons

$$\begin{aligned}\varepsilon_3^0 &= 6272 - e^{-z}(9259Z^2 + 1518Z + 6272), \\ \varepsilon_3^1 &= 7032 - e^{-z}(10381Z^2 + 1702Z + 7032), \\ \varepsilon_3^2 &= 8140 - e^{-z}(12017Z^2 + 1970Z + 8140),\end{aligned}$$

d'où

$$\varepsilon_3 = 21444 - e^{-z}(31657Z^2 + 5190Z + 21444),$$

et, par suite,

$$e = \frac{58291}{21444}, \quad e^2 = \frac{158452}{21444},$$

l'erreur portant sur les millionièmes.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

SUCCESEUR DE MALLET-BACHELIER,

QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, publiées sous les auspices du *Ministère de l'Instruction publique*, par un *Comité de Rédaction* composé de *MM. les Maîtres de Conférence*.
Deuxième Série. — Tome III, composé de 12 Numéros. Année 1874.

COMITÉ DE RÉDACTION : M. H. Sainte-Claire Deville, président; M. Bourget, secrétaire; M. Gernez, secrétaire-adjoint. — SCIENCES MATHÉMATIQUES : MM. Bertrand, Bonnet, Bouquet, Briot, Hermite, Puiseux. — SCIENCES PHYSIQUES : MM. Balard, Bertin, Darboux, Friedel, H. Sainte-Claire Deville, Troost. — SCIENCES NATURELLES : MM. Delafosse, Delesse, Des Cloizeaux, de Lacaze-Duthiers, Perrier, Pasteur, Van Tieghem.

Première Série, 7 volumes in-4, avec figures dans le texte et planches sur cuivre; années 1864-1870. 150 fr.

La Table des matières des 7 volumes de la première Série est envoyée gratuitement aux personnes qui en font la demande par lettre affranchie.

La Deuxième Série a commencé en 1872, et continue à paraître mensuellement par numéro contenant 4 à 5 feuilles, avec figures dans le texte et planches. L'abonnement est annuel et part de janvier.

Prix de l'Abonnement par année (12 NUMÉROS) :

Paris.....	30 fr.
Départements.....	35 fr.
Étranger.....	40 fr.

AOUST (l'Abbé), Professeur d'Analyse infinitésimale à la Faculté des Sciences de Marseille. — *Analyse infinitésimale des Courbes planes*, contenant la résolution d'un grand nombre de problèmes choisis, l'usage des candidats à la Licence es Sciences. 1 vol. in-8; 1873. 8 fr. 50 c.

BRIOT et BOUQUET, Professeurs à la Faculté des Sciences. — *Théorie des fonctions elliptiques* 2^e édition. In-4, avec figures; 1874. 30 fr.

CAHOIRS (Auguste), Membre de l'Académie des Sciences. — *Traité de Chimie générale élémentaire*. CHIMIE INORGANIQUE, *Leçons professées à l'École Centrale des Arts et Manufactures*. 3^e édition. 2 volumes in-18 jésus avec 230 figures et 8 planches; 1874. 10 fr.
Chaque volume se vend séparément 6 fr.

CHIMIE ORGANIQUE, *Leçons professées à l'École Polytechnique*. 3^e édition. 3 volumes in-18 jésus avec figures; 1874. Prix pour les souscripteurs. 15 fr.
Chaque volume se vend séparément. 6 fr.

GAUDIN (M.-A.), Calculateur du Bureau des Longitudes, Lauréat de l'Académie des Sciences. — *L'Architecture du Monde des Atomes*. 1 vol. in-18 jésus, avec 100 figures dans le texte; 1873. 5 fr.

HERMITE (Ch.), Membre de l'Institut, Professeur à l'École Polytechnique et à la Faculté des Sciences. — *Cours d'Analyse de l'École Polytechnique*. PREMIÈRE PARTIE, contenant le *Calcul différentiel* et les *Premiers principes du Calcul intégral*. Un fort volume, imprimé sur vélin, avec figures dans le texte; 1873. 14 fr.

La SECONDE PARTIE contiendra la fin du *Calcul intégral*.

Sans qu'il ait été besoin de sortir des considérations élémentaires, les premiers principes du Calcul différentiel et du Calcul intégral ont été exposés dans cet Ouvrage, sous le point de vue le plus propre à conduire le lecteur à l'étude des méthodes de Cauchy et des travaux de notre époque sur la théorie générale des fonctions, et en particulier des fonctions elliptiques.

HIRN (G.-A.). — *Mémoire sur les conditions d'équilibre et sur la nature probable des anneaux de Saturne*. In-4; 1872. 4 fr.

MATHIEU (Émile), Professeur à la Faculté des Sciences de Besançon. — *Cours de Physique mathématique*. In-4, avec figures dans le texte; 1873. 15 fr.

PONCELET, Membre de l'Institut. — *Traité des Propriétés projectives des figures*. Ouvrage utile à ceux qui s'occupent des applications de la Géométrie descriptive et d'opérations géométriques sur le terrain. 2^e édition, 1865-1866. 2 beaux volumes in-4 d'environ 450 pages chacun, imprimés sur carré fin satiné, avec 18 planches gravées sur cuivre, composées de 164 figures. 40 fr.

PONCELET, Membre de l'Institut. — *Cours de Mécanique appliquée aux machines*; publié par M. KRETZ, Ingénieur en chef des Manufactures de l'État. In-8, avec 117 figures dans le texte et 2 planches gravées sur cuivre; 1874. 12 fr.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

342
11/7
Hoxito, Charles
Sur la fonction exponentielle

PLA 342